

El Poder del Antibiótico **DUAL**

Para los casos **críticos**

Con la calidad europea en **Colombia**

Comprometidos con **UNA SOLA SALUD**



Neumonías

Mastitis Hiperaguda

Síndrome Mastitis
Metritis Agalactea




Qué es Marbocyl 10%?

La Marbofloxacin es el antibiótico de amplio espectro para bovinos y porcinos con una alta eficacia y respetando el uso responsable de Antibióticos.

Marbofloxacin:

- Efecto bactericida concentración dependiente contra bacterias Gram Negativas.
- Efecto bactericida tiempo dependiente contra bacterias Gram Positivas.
- 100% biodisponible luego de la inyección intramuscular o subcutánea.



¿Como actúa Marbocyl 10% de forma DUAL?

Inhíbe la ADN-girasa y la topoisomerasa IV

La bacteria muere por la filamentación sin liberación de Toxinas limitando el **SHOCK ENDOTÓXICO**

Tratamiento flexible: Dosis única o de 3 a 5 días.


Marbocyl 10% se concentra en los tejidos donde está la infección

Se absorbe en menos de 1 hora en cerdos y bovinos

Alcanza altas concentraciones en los tejidos



Relación de Concentración Tejido/Plasma en bovinos



Relación de Concentración Tejido/Plasma en cerdos




TABLA DE DOSIFICACIÓN BOVINOS

INDICACIÓN	DOSIS	TIEMPO DE RETIRO	
		Carne	Leche
Infecciones Respiratorias	2 mg/kg durante 3 a 5 días (IV/IM/SC) en la práctica 1 ml/50kg P.V.	6 días	35 horas
	8 mg/kg en una inyección única (IM) en la práctica 2 ml/25kg P.V.	3 días	72 horas
Mastitis	2 mg/kg durante 3 días (IV/IM/SC) en la práctica 1 ml /50kg P.V.	6 días	36 horas

PORCINOS: La dosis recomendada es 2 mg/kg en la práctica 1 ml/50kg P.V en una inyección única diaria por vía intramuscular durante 3 días. Tiempo de retiro: Carne 4 días.



Productos de Talla Mundial para Veterinarios de Talla Mundial